



LE COMPTOIR MARAICHER
— La maison du paysan —



Catalogue des produits phytosanitaires



Domaines d'intervention : produits phytopharmaceutiques, engrais, hygiène publique



Thiaroye sur mer coté station Shell Poste Thioroye



+221 77 291 13 09

INSECTICIDES /ACARICIDES/ NEMATICIDES



INSECTICIDES / ACARICIDES / NEMATICIDES

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
ACTAFORT (thiametox am 25WG)	ACTAFORT a un champ d'activité très large et lutte contre plusieurs insectes : les pucerons, les mouches blanches sur la culture de la tomate, poivron et melon, les pucerons de la laitue et du melon, et la mineuse sur la culture des agrumes.	Actafort est un produit hautement systémique, il agit par ingestion et par contact sur les insectes cibles. Il est doté d'une activité systémique et d'une pénétration rapide dans la plante	Dose : 100 à 200 grammes pour 300 à 500l d'eau par hectare DAR : 3 à 7 jours	

Cibles



C Farineuse



Punaise



M blanche



M mineuse



Thrips




INSECTICIDES / ACARICIDES / NEMATICIDES

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
ARSENAL (profenofos 500g /l)	Efficace pour le contrôle des ravageurs phytophages et xylophages des organes Florofruitifères et des acariens sur plusieurs cultures. Dans les cultures maraichères , il est particulièrement indiqué pour le contrôle de Helicoverpa armigera de la tomate et du maïs , plutella et Hellula du chou.	insecticide et acaricide non systémique agissant par contact. Il présente un effet translaminaire et possède des propriétés ovicides.	Dose : 1 à 2 litres par ha soit 80ml pour 16 L DAR : 15 jours	
BACIL FORT (Bacillus Thuringiensis Var: Kurstaki)	Efficace contre les chenilles de Lépidoptères, par exemple : Noctuelle de la Tomate Heliothis armigera, Cydia pomonella, la teigne de la pomme de terre , Tuta absoluta sur la tomate.	Ce produit corrode la paroi intestinale, ayant pour effet de paralyser les mâchoires de la chenille. Par conséquent, quelques heures après l'absorption du produit, la chenille cesse de s'alimenter et meurt.	DOSE : 1 kg/ha pour 300 à 500 litres d'eau soit 80g pour 16 litres DAR : 3 jours	

Cibles



INSECTICIDES / ACARICIDES / NEMATICIDES

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
BAZOKA (100G/L de Chlorantraniliprole et 50G/L de Lambda Cyhalothrine)	Insecticide de nouvelle génération, redoutable contre Tuta Absoluta, mouches du chou, chenilles et Chrysomèle du maïs. Il élimine à la fois les œufs et les larves contrôlant ainsi les ravageurs.	Le Chlorantraniliprole agit par activation des récepteurs Ryanodine, tandis que le lambda-Cyhalothrine agit par contact et ingestion. Longue rémanence : les deux matières actives persistent dans la plante ce qui permet une protection prolongée.	A appliquer 35 à 40 jours après la transplantation ou le semis. effectuer 2 à 3 applications consécutives. Dose : 250 à 300 ml / ha	




INSECTICIDES / ACARICIDES / NEMATOCIDES

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
BULDOZER (Thiamethoxame 27g/l + lambdacyhalothrine 20g/l)	Buldozer a un champ d'activité très large et lutte contre plusieurs insectes sur la culture de la tomate, poivron, piment, melon, oignon, les pucerons de la laitue et la mineuse sur la culture des agrumes.	Buldozer est un produit hautement systémique, il agit par ingestion et par contact sur les insectes cibles. Il est doté d'une activité systémique et d'une pénétration rapide dans la plante avec une triple action.	DOSE : 1 L/ha 80cc / 16 L d'eau DAR : 3 à 7 jours	




INSECTICIDES / ACARICIDES / NEMATOCIDES

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
BULDOZER plus (Thiamethoxame 106g/l + lambdacyhalothrine 141g/l)	Buldozer a un champ d'activité très large et lutte contre plusieurs insectes sur la culture de la tomate, poivron, piment, melon, oignon, les pucerons de la laitue, et la mineuse sur la culture des agrumes.	Buldozer est un produit hautement systémique, il agit par ingestion et par contact sur les insectes cibles. Il est doté d'une activité systémique et d'une pénétration rapide dans la plante avec une triple action.	DOSE : 200 à 300 ml/ha 30cc / 16 L d'eau DAR : 3 à 7 jours	




INSECTICIDES / ACARICIDES / NEMATOCIDES

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
BIO TRAP (Méthyleugénol 75 % Malation 25%)	Médiateur chimique à appliquer contre les mouches (cératite...) sur la culture de la mangue, du piment, poivron et des agrumes .	Biotrap est médiateur chimique contenant une phéromone chimique. Un attractif sexuel. le methyl eugenol qui attire inexorablement les males de l'espece bactrocera spp. Ainsi qu'un insecticide, le malation qui agit par inhalation et achève tout insecte qui s'approche près de la source de l'émission de l'odeur	Dose : flacon 125ml à imbiber sur une surface absorbante (coton, tissu) pour une superficie de ¼ ha	



INSECTICIDES / ACARICIDES / NEMATOCIDES

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
COBRA 200 SC (180G/L de spiroticlofène+20G/L d'abamectin) Suspension Concentrée	COBRA 200 SC, le Spirodifène et l'abamectine protègent les cultures en contrôlant efficacement les populations d'acariens nuisibles, notamment les tétranyques, ériophyides et les tarsonèmes. Leur utilisation combinée aide à réduire les dommages causés par ces ravageurs, améliorant ainsi la santé des cultures maraichères.	Le COBRA 200 SC est un acaricide qui agit par contact et ingestion en inhibant la biosynthèse des lipides. Il est efficace contre tous les stades des acariens, avec une forte action ovicide et une réduction de la fertilité des femelles.	Dose : 20 ml pour 1 pulvérisateur de 16 litres d'eau ou 500 ml pour 400L à 600 litres d'eau par Hectare DAR : 7 Jours	



INSECTICIDES / ACARICIDES / NEMATICIDES

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo des produits
CYPERMET (Cyperméthrine 100g/L ou 250g/l)	Il est efficace sur un grand nombre de larves, de coléoptères de lépidoptères et d'insectes piqueurs suceurs sur arbres fruitiers, cultures légumières, cultures industrielles et pomme de terre en végétation.	Il agit par contact et ingestion à des doses très faibles. Inhibe la ponte chez les adultes et empêche les larves de se nourrir.	DOSE : 50ml à 100 ml pour 16 L DAR : 3 à 7j.	



INSECTICIDES / ACARICIDES / NEMATICIDES

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
CLORSBAN (Chlorpyrifos-ethyl 480g/L ou 500g/kg)	Il est efficace aussi bien en agriculture qu'en hygiène publique. En agriculture, le traitement est effectué avant semis ou plantation avec incorporation de la poudre dans le sol (pour la formulation granulée).	CLORSBAN 48 EC agit par contact et par ingestion sur les insectes dont il inhibe la CHOLINESTRERASE .	Noctuelles terricoles des cultures maraichères et insectes du sol des céréales : 125 à 150 ml Hygiène Publique: 200 ml pour 10 litres d'eau	
CONFIDA (Imidaclopride 200g/L)	Il présente un large spectre d'efficacité contre les insectes piqueurs-suceurs que sont les pucerons. Et les mouches blanches des cultures de la Tomate,, Piment, Poivron, Patate douce, Pomme de Terre, Carotte, Chou, Courgette, Melon, Pastèque, Haricot Vert, Gombo Très efficace contre les cochenilles farineuses .	pénètre rapidement dans la plante et grâce à sa forte systémie il est véhiculé très rapidement dans l'ensemble de la plante.	DOSES : 0,25 litre par hectare soit 20ml pour 16L DAR : 7 jours	

Spécifique a closban



INSECTICIDES / ACARICIDES / NEMATOCIDES


Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
DELTAMET (Delthamethrine 12,5g/L ou 25g/l)	Insecticide à large spectre systémique pour la protection des cultures maraîchères et fruitières contre les piqueurs suceurs , il est également efficace sur la majorité des insectes nuisibles en hygiène publique (mouches, moustiques cafards).	Il agit par contact et ingestion sur les insectes à des doses très faibles et présente une action rapide avec un effet choc .	Dose : 200 à 500 ml par hectare soit 20 à 40 ml pour 16 litres DAR : 3 à 7 jours	




DICHLOFORT 100EC (1000g/L de dichlorvos)	Insecticide puissant pour lutter contre les ravageurs en santé publique. Il est polyvalent avec un effet débusquag. Efficace contre les piqueurs suceurs en maraichage.	Insecticide organophosphoré qui agit sur l'acetylcholinérase associé au système nerveux des insectes.	Dose : 10 à 12,5 pour 1 litre d'eau soit 125ml pour 10L d'eau	
--	---	---	--	--

INSECTICIDES / ACARICIDES / NEMATICIDES

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
DIMETO (dimethoate 400g/l)	Efficace contre les mouches blanches sur cultures maraîchères ; contrôle une large gamme d'acariens, aphididae, aleyrodidae, coccidae, coléoptères, collemboles, diptères, lépidoptères, Pseudococcidae.	Se caractérise par une longue persistance d'action et à travers un triple mode d'action (Contact, Inhalation et Ingestion).	Dose : 2 litres par hectare soit 80ml pour 16L DAR : 15 Jours	



INSECTICIDES / ACARICIDES / NEMATOCIDES

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
DICHLO Contient du 1,3 Dichlopropene EC 1110g/L	DICHLO est un fumigant utilisé principalement pour la désinfestation des sols avant la plantation, en ciblant les nématodes, qui sont des parasites du sol nuisibles aux cultures. Il est souvent utilisé dans les cultures de pommes de terre, de tomates, de fraises et de carottes pour réduire les populations de nématodes et ainsi protéger les racines des plantes.	Le 1,3-dichloropropène agit en pénétrant dans le sol sous forme de gaz, où il est absorbé par les nématodes et d'autres organismes du sol. Il perturbe les fonctions cellulaires des parasites, notamment en affectant leur respiration et en endommageant les membranes cellulaires, ce qui entraîne leur mort	Dose : 150 et 300 litres par hectare	



INSECTICIDES /ACARICIDES/ NEMATOCIDES

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
EMAFORT (Emamectine Benzoate 80g /l+ Lufénuron20g/l)	Ses propriétés translaminaires lui confèrent une efficacité accrue sur les larves du Noctuelle de la Tomate Heliothis armigera , Lobesia botrana, Carpocapse des pommes et des poires Cydia pomonella Pomme de terre (Teigne), Tomate (Tuta absoluta)	Insecticide larvicide qui peut être utilisé en préventif ou en curatif . Il agit par ingestion. lufenuron inhibe la synthèse de la chitine et est utilisé pour détruire les larves d' insectes et certains champignons .	0,5L à 1L par hectare soit 40 à 80ml pour 16L d'eau DAR : 7jours	



EMAFORT (Emamectine Benzoate 40g /l+ Lufénuron10g/l)	Ses propriétés translaminaires lui confèrent une efficacité accrue sur les larves du Noctuelle de la Tomate Heliothis armigera , Lobesia botrana, Carpocapse des pommes et des poires Cydia pomonella Pomme de terre (Teigne), Tomate (Tuta absoluta)	Insecticide larvicide qui peut être utilisé en préventif ou en curatif . Il agit par ingestion. lufenuron inhibe la synthèse de la chitine et est utilisé pour détruire les larves d' insectes et certains champignons .	2L par hectare soit 100 à 160ml pour 16L d'eau DAR : 7jours	
---	--	--	--	---


INSECTICIDES /ACARICIDES/ NEMATOCIDES

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
ETOFORT (ETOXAZOLE 150g/kg)	ETOFORT 150WP peut être utilisé sur les cultures maraîchères et vivrières. Pour rappel : les acariens sont des arthropodes de la classe des Arachnides (comme les araignées).	ETOFORT 150WP possède un mode d'action unique : il agit comme un inhibiteur de croissance chez les acariens IL agit sur les œufs en perturbant la formation de leurs organes de respiration et sur les larves d'acariens en inhibant le processus de la mue.	Dose : 200g par hectares 10 à 20g ml pour 16l d'eau DAR : 3 à 7jours	




INSECTICIDES /ACARICIDES/ NEMATICIDES

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
GRANOFORCE bleu (imidaclopride 20%+ chlorotalonil 20%+ difenoconazol 2%)	Granoforce rouge et bleu sont efficaces pour la protection des semences d'haricots, de niébé, de coton, de riz, de maïs, d'arachides... mais aussi contre les pathogènes du sol.	Ils possèdent une action protectrice et curative (insecticide fongicide agissant par contact et par ingestion).	Dose : Arachides, haricots : 100g pour 100kg de semences Maïs, riz, coton : 100g pour 50kg de semences	 
GRANOFORCE rouge (perméthrine 25g/kg et thiram 250g/kg)			Dose: 25g pour 10kg de semences	



INSECTICIDES /ACARICIDES/ NEMATOCIDES

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
INDOMAX (Indoxacarbe 150g/L ou 50g/l)	Efficace contre les piqueurs suceurs et des chenilles des cultures comme Tomate, Aubergine, Oignon, Piment, Poivron, Patate douce, Pomme de Terre, Carotte, Chou, Courgette, Melon, Pastèque, Haricot Vert, Gombo, Manguiers, Agrumes, papayes.	Insecticide systémique qui possède un mode d'action unique agissant sur les canaux sodiques des cellules nerveuses des insectes ciblés, provoquant leur fermeture.	Doses : 170mL/ha pour le 150g/L soit 10 à 20ml pour 16 litres 1 litre par hectare pour le 50g/l soit 80ml pour 16 litres DAR : 3 jours	



INSECTICIDES /ACARICIDES/ NEMATOCIDES

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
KANGAM (Abamectine 18g/l+ acétamipride 32g/l + Bifenthrine 15g/l)	Insecticide et acaricide doté d'une triple action rapide et efficace sur un large spectre d'insectes nuisibles aux cultures, spécialement les pucerons, les aleurodes, mouches blanches, mineuses des feuilles, acariens etc.	Abamectine est un insecticide acaricide efficace et a un large spectre Acetamipride est un insecticide doté d'une forte perméabilité et d'une action toxique rapide. Bifenthrine est un insecticide et acaricide appartenant à la famille des pyréthriinoïdes. Hautement systémiques, ils agissent par ingestion et par contact sur les insectes cibles avec une triple action.	DOSE : 0,3L par hectares soit 40 à 80ml pour 16L d'eau DAR : 7jours	



INSECTICIDES /ACARICIDES/ NEMATOCIDES

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
KILLER (Acetamipride 50g/L)	Insecticide doté d'une action rapide et efficace sur un large spectre d'insectes nuisibles aux cultures, notamment les hémiptères (aleurodes, pucerons, cochenilles etc.) les lépidoptères (mineuses) et les coléoptères (doryphores de la pomme de terre).	Killer 50SL appartient à la famille des néonicotinoïde. C'est un insecticide qui agit par contact et ingestion altérant le fonctionnement du systèmes nerveux.	Dose : 0,5L à 1L par hectare 40 à 80ml pour 16l d'eau DAR : 7jours	



INSECTICIDES /ACARICIDES/ NEMATOCIDES

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
-------------	-----------------	---------------	-------------	------------------

LAMDAFORT (Lambda-cyhalothrine 50g/L)	Lambdafort 50 EC est efficace contre les pucerons, thrips et piqueurs suceurs présents sur de nombreuses cultures : Tomates, courgettes, choux, aubergines, concombres cornichons, poivrons etc.	Insecticide et acaricide agissant par contact et ingestion avec une triple action.	DAR : 3 à 7 jours	
---	--	--	-------------------	---




MALATHION (500g/l de malathion658)	Efficace contre les fourmis, les tétranyques les criquets les millipèdes, les araignées les mouches les larves de moustiques et les cloportes communs.	Insecticide et acaricide agissant par contact et ingestion	1 à 2.75L par hectare soit 80ml à 160ml pour 16 litres d'eau Dar 3 à 7jours	
--	--	--	---	--



INSECTICIDES /ACARICIDES/ NEMATOCIDES

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
METOX (Methomyl 900g/kg 200g/Kg)	Cultures: maraîchères (maïs, pommes de terre, Tomates, oignons, choux, concombre etc). Cible : Lépidoptères (œufs et larves), piqueurs- suceurs, chenilles mineuses	Doté de propriétés systémiques et translaminaires, ce produit agit par contact et ingestion sur de nombreux insecticides nuisibles.	1,5 à 2,5 litres / Ha soit 80ml pour 16litre d'eau DAR 15 JOURS	



POUDRE SALOUM (250gr/kg de Thirame + 250gr/kg de Chlorpyrifos ethyl)	Poudre Saloum permet de protéger les semences contre les insectes et les maladies du sol, et favorise la germination.	thirame est un fongicide de contact et le chlorpyrifos ethyl agit par contact, ingestion et inhalation sur un grand nombre de ravageurs	DOSE; 40gr / 10 Kg de semences	
---	--	---	---------------------------------------	--



INSECTICIDES / ACARICIDES / NEMATOCIDES

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
MAXIFLO 50% WG Contient 500G/KG de Flonicamide Granulés dispersibles	MAXIFLO est un insecticide utilisé pour contrôler divers insectes nuisibles sur une gamme de cultures, notamment les légumes, les fruits et les céréales. En granulés dispersibles, il est appliqué pour cibler principalement les pucerons, les aleurodes et les thrips.	Le flonicamide agit en bloquant les récepteurs de l'acétylcholine dans le système nerveux des insectes, ce qui perturbe la transmission des impulsions nerveuses et entraîne leur paralysie. Cette action ciblée conduit à la mort des insectes nuisibles.	MAXI FLO 50% WG peut être appliqué avant ou après la floraison. Fruits à pépins : 0,01 % (160g/ha) Pomme de terre : 160 g/ha Concombre : 0,01% en serre Courgette : 100 g/ha DAR: 3 à 7 jours.	



INSECTICIDES /ACARICIDES/ NEMATOCIDES

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
OXAMI (240 g /l d'Oxamyl), OU NEMATOX (100G/KG OXAMY)	c'est un produit systémique à multi usage : Nématicide, Insecticide efficace contre les nématodes des cultures maraîchères, les mineuses, les pucerons, mouches blanches thrips et acariens.	OXAMI agit par contact sur les nématodes et entraîne leur incapacité à se déplacer vers les racines, ainsi que l'inhibition de l'incubation et l'éclosion des œufs.	20 kg par hectare (granulé) Liquides 6 litre par hectares	



PASCHMINE (Lambdacyhalothrin 30G/L+ Acétamipride 20G/L)	Paschmine est très efficace contre les pucerons, aleurodes, mouches, mineuses et doryphore qui attaquent la plupart des cultures légumières.	Il possède une action de choc (effet contact) élevée, peu dépendante de la température, ainsi qu'une longue persistance d'action.	traitements à 1,5 L/ha DAR : 15 jours	
---	---	--	--	--



INSECTICIDES /ACARICIDES/ NEMATICIDES

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
PIRIFORT (Pyridabéne 200g/L)	Efficace contre les piqueurs suceurs, les acariens et les araignées rouge fréquent dans toutes les cultures maraichères, les agrumes et la papaye.	Insecticide acaricide non systémiques (par contact Un bon recouvrement du feuillage est nécessaire)	Dose : 1 litre par hectare soit 80ml pour 16 litres d'eau DAR : 15 JOURS	
				
TONNERRE (Bifénazate 100g/L)	Insecticide acaricide efficace contre les acariens (araignées rouge) fréquent dans toutes les cultures maraichères, la papaye etc.	Insecticide acaricide non systémique agissant sur le système nerveux. Il induit la paralysie des acariens, thrips et d'autres ravageurs.	Dose :1L par hectare 80ml pour 16litres d'eau DAR : 3 JOURS	

INSECTICIDES /ACARICIDES/ NEMATOCIDES

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
TONNERE plus 300 SC (200 G/L de Bifénazate et 100G/L d'étoxazole)	Insecticide acaricide à large spectre efficace sur les acariens, thrips et autres ravageurs avec un court délai avant récolte. Il est aussi efficace contre l'acariose bronzée fréquente dans toutes les cultures maraichères, la papaye etc....	Le bifenazate agit rapidement et efficacement sur les œufs, les larves et les adultes des acariens à différents stades de développement. L'étoxazole est particulièrement efficace contre les œufs, les larves et nymphes d'acariens, avec un effet rapide et une durée d'action prolongée. Ces deux acaricides sont utilisés en combinaison pour maximiser leur efficacité et prévenir le développement de résistances chez les acariens.	Dose : 0,5L par hectare 40ml pour 16litres d'eau DAR : 3 JOURS	



INSECTICIDES / ACARICIDES / NEMATICIDES


Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
DICOFORT (Pyridabène 102g/l+ Abamectine 10g/l)	Larvicide autocide spécifique contre les acariens et les mineuses sur arboricultures et cultures maraîchères . Il est efficace contre un spectre très large d'acariens.	Insecticide/acaricide par contact (pyridabène) et systémique (abamectine) Il assure une large protection contre la plupart des insectes et des acariens.	Dose: 1litre par hectare ou 80ml pour 16l DAR : 15Jours	



SUPER ABAM OU ABAMEC 20EC (Abamectine 20 g/L)	Larvicide autocide spécifique contre les acariens et les mineuses sur arboricultures et cultures maraîchères . Il est efficace contre un spectre très large d'acariens.	Insecticide/acaricide translaminaire, Super Abam 18 EC pénètre très rapidement dans le végétal et reste stocké et actif à l'intérieur des tissus de la plante.	DOSE : 4 litres par hectare DAR : 3 à 7 jours	
--	--	--	--	---

INSECTICIDES /ACARICIDES/ NEMATOCIDES

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
SOUYE BALAI (propoxur 75%wp)	Insecticide à vaste champs d'efficacité contre les moustiques les cafards, les insectes broyeur (criquets chenilles coléoptères) et les piquets suceurs (pucerons punaises).	Insecticide de contact et d'ingestion Le propoxur est un inhibiteur des cholinestérases.	Usage domestique : 25g pour 30 à 50m2 Usage agricole 25g pour 100l d'eau soit 1kg par hectare DAR : 7jours	



TERMINUS (2,5% D imidaclopride)	efficace contre les insectes volants et rampants (cafards, puces, punaises, moustiques etc. mais aussi efficace contre les piqueurs suceurs des cultures maraichères.	Il agit avec un effet choc tuant l'ensemble des moustiques dans un délai de 30 mn.	50g pour une pièce de 30 à 50m2 Usage agricole 50g pour 15 à 20 litres d'eau DAR 7jours	
--	--	--	--	---

INSECTICIDES /ACARICIDES/ NEMATICIDES

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
NEMACHOC (10% FOSTHIASATE)	Il s'applique en traitement du sol et est efficace contre les nematodes et taupin sur les cultures maraichères.	Inhibition de l'acétylcholine estérase chez les nématodes et autres parasites. Son excellente action systémique offre également des performances élevées contre nématodes et insectes nuisibles foliaires. Nemachoc contre les stades larvaires mobiles des nématodes dans le sol et prévient envahissement des racines des cultures.	Dose : 30 kg par hectare (granulé)	



MACOPHOS (ethoprophos 10 %)	c'est un produit systémique à multi usage : Nématicide, Insecticide efficace contre les nématodes des cultures maraîchères .	Macophos agit par contact sur les nématodes et entraîne leur incapacité à se déplacer vers les racines, ainsi que l'inhibition de l'incubation et l'éclosion des œufs.	Dose : 40 kg par hectare (granulé)	
---------------------------------------	--	---	---	---

INSECTICIDES /ACARICIDES/ NEMATOCIDES

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
-------------	-----------------	---------------	-------------	------------------

TERPRID (cypermethrin 21g/l acetamiprid 10g/l profenofos 50g /l)	Efficace contre les piqueurs suceurs présent sur de nombreuses cultures (tomates, concombres, aubergines cornichons, courgettes, laitues, poivrons etc.....)	Insecticides et acaricides agissant par contact et ingestion avec une triple action qui assure la protection complète de la plante.	Dose : 1litre par Hectare, 80ml pour 16 l d'eau Dar : 15 jours	
---	--	--	---	---



PANTHER (cypermethrin 401g/l a profenofos 400g /l)	Efficace contre les piqueurs suceurs et chenilles présents sur de nombreuses cultures (tomates, concombres, aubergines cornichons, courgettes, laitues, poivrons etc.)	Insecticide et acaricide agissant par contact et ingestion avec une triple action qui assure la protection complète de la plante.	Dose : 1litre par Hectare, 80ml pour 16 L d'eau Dar : 15 jours	
--	---	--	---	---


INSECTICIDES /ACARICIDES/ NEMATICIDES

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
THERMIFORT (FIPRONIL 5% g / l)	Concentré hydro dispersable , anti-termites, destiné au traitement préventif et curatif par aspersion, injection ou épandage des constructions.	THERMIFORT élimine les termites à la fois par ingestion et par contact et est mortel pour les termites simplement par contact avec d'autres	Dose : Murs : 0,2 litre pour 100 litres d'eau. Sols : 0,1 litre pour 100 litres d'eau.	



INSECTICIDES (LES FUMIGANTS)

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
Alphox 57 % (Phosphure aluminium 570g/kg)	Il est un pesticide fumi- gène antiparasitaire et acaricide, utilisé pour l'élimination des insectes se présentant généralement dans le stockage des céréales	phosphure d'aluminium ... Mode et site d'action : inhibiteur du complexe IV dans la chaîne de transport mitochondrial de l'insecte .	Dose : Produit alimentaire 5 à 20 comprimés par tonne Produits contenus dans les emballages 5 à 10 Comprimés par tonne métrique.	




INSECTICIDE BIOLOGIQUE

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
SPINOMAX (240 g/l de spinosade)	Insecticide biologique à effet de choc contenant 240 g/l de spinosade. Suspension Concentrée efficace contre divers ravageurs des cultures fruitières et maraîchères (Tomates, pommes de terre, choux oignons, piment, mangues) avec une persistance d'action de deux semaines.	SPINOMAX 240 SC agit principalement en tant que neurotoxique sur les insectes. Son mode d'action se déroule en plusieurs étapes : Par Interaction avec le système nerveux, il se lie à des récepteurs spécifiques de l'acétylcholine, entraînant la paralysie des ravageurs. Il agit aussi par contact et ingestion, ce qui le rend actif sur les jeunes larves.	Dose: Piment : 500 ml/ha Chou : 300 ml/ha Pomme de terre : 600ml/ha Oignons : 400 ml/ha DAR: 3 jours (piment, chou, pomme de terre); 7 jours (oignons, mangues)	





INSECTICIDES /ACARICIDES/ NEMATOCIDES

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
YAKAAR (400G/l de Chlorpyrifos ethyl et 24 G/l de deltamethrine)	Insecticide à large spectre efficace pour lutter contre une grande variété de ravageurs du piment, du chou et des tomates tels que les piqueurs suceurs, araignées rouges, pucerons, coléoptères, altises, hyphantria, larves de mineuses, papillons nocturnes, tétranyques, tenthrèdes, tordeuses, mouches blanches.	Le chlorpyrifos-éthyl agit par contact, ingestion et inhalation (vapeur) sur un grand nombre de ravageurs. Il possède un effet neurotoxique et manifeste une longue persistance d'action. La deltaméthrine agit par contact et ingestion sur un grand nombre d'insectes à des doses très faibles, puis continue à protéger les cultures sur une période de 2 semaines. Elle a une action très rapide (effet de choc) et un effet répulsif (rémanence). Leur combinaison permet d'accroître leur efficacité.	Dose : 1,5 à 2 L d'eau par hectare DAR : 7 jours	





FONGICIDES




FONGICIDES

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
AZODIF (200g/l d'azoxystrobine 125g/L difenoconazole)	Fongicide polyvalent à large spectre, AZODIF assure la protection des cultures maraichères, fructifères contre de nombreuses maladies fongiques de façon préventive et curative.	Avec un effet anti sporulant, Azoxystrobine inhibe la respiration des champignons au niveau des mitochondries. Difenoconazole a une action systemique local et stoppante en inhibition de la synthèse des stéroles.	DOSE 300 ml par hectare dans 300 litres d'eau, soit 20ml pour 16L DAR : 3 Jours	



Azofort (Azoxystrobine 250g/L)	Assure la protection des cultures maraichères, fruitières et florales contre les Mildiou, Oïdium, Rouille, Anthracnose, Pyriculariose, Cercosporiose, Helminthosporiose etc... .	Action préventive et curative . Traiter dès le début de l'attaque, A appliquer toutes les 2 semaines dès l'apparition des jeunes feuilles.	DOSE : 750 ml par hectare dans 300 litres d'eau, soit 40ml pour 16L	
---	---	--	---	---

FONGICIDES

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
CYMOX 450WP (450G/KG de Cymoxanil poudre mouillable)	CYMOX est un fongicide utilisé principalement pour lutter contre les maladies des plantes causées par les oomycètes, comme le mildiou.	Le cymoxanil agit en pénétrant rapidement dans les tissus végétaux, où il interfère avec la synthèse des protéines et la division cellulaire des pathogènes. Son action curative est efficace surtout dans les premiers stades de l'infection, empêchant la propagation des maladies	Dose: 200 à 300 gr/ha DAR: 7 à 21 Jours	



FONGICIDES

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
DIFENOX (250 g/L difenoconazole)	Fongicide polyvalent à large spectre, efficace sur de nombreuses cultures maraichères, fructifères contre de nombreuses maladies fongiques de façon préventive et curative.	Effet anti sporulant Difenoconazole a une action systémique rapide ce qui le met à l'abri du lessivage. Il inhibe la sporulation des champignons.	DOSE : 500 ml par hectare dans 300 litres d'eau Soit 50ml pour 16L DAR : 14Jours	




FONGICIDES

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
CHLOROTHAL (chlorothal 720g/L- SC)	Fongicide organique à large spectre contre le Mildiou, le rougeot, alternariose, le septoriose , et l'excoriose utilisable en arboriculture fruitière, en cultures légumières (pomme de terre, tomates, carottes, oignons, aubergines).	Chlorothal est un fongicide de contact et doit être utilisé de manière préventive . Pour une bonne efficacité, la bouillie doit être pulvérisée régulièrement et le traitement doit être répété car il adhère très bien sur les feuilles et résiste à la pluie .	2 à 3 Litres / Hectare Soit 160 140ml pour 16litre d'eau	



FOSETAL (FOSETYL ALUMINIUM 80% WDG)_	Il permet une protection complète pendant tout le cycle de développement de la plante, ce qui le rend actif contre de nombreux champignons responsables des maladies telles que le phytophthora, etc.. des cultures maraichères (tomate, pomme de terre concombre piment) et fruitière (mangue papaye banane)	Utilisable sur plusieurs cultures, FOSETAL 80 WG a une action préventive et curative sur de nombreux champignons phycomycètes, en bloquant la germination des spores. Il est doté d'un excellent système ascendant et descendant : absorbé par les feuilles et les racines .	250g pour 100 litres Soit 2,5kg par hectare DAR : 3 à 7jours Agrumes 15 jours	
--	---	---	--	--

FONGICIDES

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
FONGISTAR (267G/L de Boscalid et 67G/L de Pyraclostrobine - Suspension Concentrée)	FONGISTAR est un fongicide puissant à large spectre d'action, utilisé pour les cultures maraîchères, les petits fruits, les fruits à noyaux, ainsi que les gazons et terrains de golf. Il assure un rendement optimal en agissant de manière préventive ou dès l'apparition des maladies telles que le mildiou, l'oïdium, et la pourriture noire.	L'association de la pyraclostrobine et du boscalid offre un excellent contrôle des maladies grâce à leurs modes d'action complémentaires. Cette combinaison renforce l'efficacité, élargit le spectre d'action, et réduit le risque de développement de résistances. De plus, leur mobilité translaminaire et systémique assure une large diffusion des substances actives au sein de la plante.	Dose: 0,8 à 1 L / ha DAR : 21 Jours	 FONGISTAR est un fongicide pour cultures maraîchères, petits fruits et fruits à noyaux, qui agit de manière très puissante, pour une efficacité optimale. Ce fongicide unique à large spectre d'action offre le plus haut rendement. Son application est agréée sur toutes sortes de cultures de légumes, certains fruits mais également sur les gazons et terrains de golf. Le produit est à appliquer préventivement ou dès l'apparition des maladies (mildiou, oïdium, pourriture noire, phomopsis, botrytis etc.). Volume Net : 20 litres




FONGICIDES

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
FONGIPRO 750 WG (250g/kg de Trifloxystrobin + 500g/kg Tébuconazole) Granulés dispersibles	FONGIPRO est un fongicide très performant contre l'oïdium, le black-rot et ainsi que pour les cultures légumières contre la rouille, l'oidium, l'alternaria et la stemphyliose.	FONGIPRO 750 WG est un fongicide qui combine deux modes d'actions : la trifloxystrobine agit préventivement sur la germination des spores par inhibition de la respiration cellulaire. Le tébuconazole, doté de propriétés systémiques, agit préventivement et curativement en inhibant la biosynthèse des stérols de la membrane du champignon. Leur combinaison permet une action rapide et efficace.	Dose : 300 gr/ha DAR: 3 jours pour le melon et 21 jours pour les autres cultures maraichères	



FONGICIDES



Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
THIOMEX (THIOFANATE- R- METHYL 500 G/ L)	THIOMEX est efficace contre les maladies des céréales, des cultures maraichères , la floriculture et la culture fruitière (pourriture grise , fumagine , mildiou fusarioses).	THIOMEX 500 SC est un fongicide de contact et systémique, son action est préventive et curative.	DOSES : 1.5 à 2 litres par hectare DAR : 15 jours	



MANCODIM (MANCOZEBE 60% / DIMETHOMORPHE 9% WP)	MANCODIM est un fongicide anti-mildiou qui apporte une action originale et compète sur le mildiou et le black-rot, une longue persistance d'action, une protection élevée des feuilles.	MANCODIM peut être utilisé pendant toute la période de lutte contre le mildiou, jusqu'à 7 jours avant la récolte. TRAITER EN PREVENTIF dès que les risques sont immanent mais aussi en curatif pour stopper l'évolution de la maladie.	2kg par hectare DAR : 7 jours	
--	--	--	---	---

FONGICIDES


Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
FONGIS (OXYCHLORURE DE CUIVRE 50%)	FONGIS 50% WP est un fongicide à base d'oxychlorure de cuivre. Élément naturel, il est connu pour son rôle de protection des végétaux contre l'action néfaste de nombreux pathogènes : les champignons et les bactéries.	Mode d'action : Foliaire, Préventif. Site d'action : FONGIS 50% WP est un produit de contact qui inhibe la germination des spores par une réaction multi site. Aussi, il a une action bactéricide en bloquant leur multiplication	DOSE : 3à 5 kg par hectare Soit 150 à 200g pour 16 litres d'eau DAR : 3jours	




FONGIMAX (20% Zinebe 11% d'oxychlorure de cuivre 12 % thiophanate méthyl)	Fongimax a un effet préventif et curatif pour la protection des cultures maraichères et fruitières avec une action systémique et de contact	Fongicide à large spectre efficace contre les maladies fongiques et bactériennes présents dans les cultures des fruits et légumes Riche en zinc avec un effet bactéricide fongimax inhibe la germination des spores par réaction multi sites	DOSE : 2kg /hectare Soit 200g pour 20 litres d'eau DAR : 5 JOURS	
---	---	---	--	--

FONGICIDES

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
MAXICUIVRE 65,6% WP (HYDROXYDE DE CUIVRE 65,6%)	MAXICUIVRE est un fongicide bactéricide de contact efficace pour la protection des cultures maraîchères et fruitières. Il agit de manière très puissante contre les champignons et bactéries phytopathogènes . Il est doté d'un large spectre d'action et augmente le rendement. Le produit est à appliquer préventivement ou dès l'apparition des maladies (mildiou, rouille, anthracnose, alternariose, cladosporiose, cercosporiose, bactériose etc..).	MAXICUIVRE empêche la germination des spores. Les ions cuivreux qui sont libérés altèrent la perméabilité des membranes du champignon et perturbent son activité enzymatique et protéique.	DOSE : 4 kg par hectare, soit 150 à 200g pour 16 litres d'eau DAR : 3 à 7 jours	



FONGICIDES

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
IPRODEX (IPRODIONE 500g/L)	IPRODEX est un fongicide à large spectre d'efficacité agissant contre diverses maladies fongiques en arboriculture, cultures de baies, cultures maraîchères , grandes cultures et cultures ornementales.	IPRODEX est un fongicide de contact avec une efficacité pénétrante. Le mode d'action de l'Iprodione est très complexe.	1,5 à 2 L pour 500L d'eau par hectare DAR : 1jour	



PROMOCARB (722G/L de Propamocarbe)	Un fongicide à large spectre d'efficacité agissant contre diverses maladies fongiques tel que pythium mildiou rizoctonia sur les cultures maraichères et arboricoles.	Propamocarbe est une substance active dotée de propriétés systémiques ascendantes (voie acropétale) et translaminaire agissant d'une manière préventive et curative sur les champignons.	Dose : 3L par hectare DAR : 17 jours	
---	---	--	---	--



FONGICIDES

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
MANCOZEB (mancozeb 80% WP)	fongique en arboriculture, cultures de baies, cultures maraîchères, grandes cultures et cultures ornementales	MANCOZEB 80 WP est un fongicide préventif de contact actif sur un très grand nombre de champignons. Sa résistance au lessivage par les pluies et sa faible dégradation par les rayons ultraviolets du soleil lui confèrent une grande persistance d'action.	Dose : 3 à 4kg par hectare 200g /16l DAR : 15 Jours	



SULPHUR (800g/Kg soufre)	Fongicide biologique à base de soufre mouillable, d'origine minérale utilisé pour la protection contre l'oïdium et l'acariose sur plusieurs cultures maraîchères et arboricoles.	Produit lessivable qui affecte les processus respiratoires chez le champignon, inhibe la germination des spores ainsi que la croissance du mycélium déjà installé superficiellement.	Dose : 0,6 à 1 Kg/hl soit 2 à 4 kg par hectare DAR : 1 à 3 jours	
------------------------------------	---	--	---	--



HERBICIDES



HERBICIDES: HERBICIDE POST LEVÉE

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
BASAFORT (Bentazone 480g/ L)	Pour la suppression sélective en post émergence des mauvaises herbes à feuilles larges dans les cultures de Soja, Haricots secs, Maïs, Arachides, Légumineuses, oignons.	herbicide contact . Son absorption par la plante se fait avant tout par le feuillage, il est important de bien mouiller le feuillage pour avoir une suppression efficace.	DOSES DE TRAITEMENT 1, 75 à 2 litres DAR : 28 à 90 Jours	



OXYFORT (Oxyfluorène 240g/L)	Appliquer OXYFORT lorsque les mauvaises herbes sont petites. Au besoin, répéter les applications pour supprimer les mauvaises herbes qui germent tardivement.	OXYFORT 240 EC agit par en Post-levée contact sur les plantules en place et au fur et à mesure de leur germination. C'est un anti graminées et anti dicotylédones spécifique de pré-germination , avec action de contact sur jeunes plantules.	DOSE : 500 ml dans 500 litres d'eau par hectare DAR : Minimum 56 jours	
---	---	---	--	--

**Recommandé sur
l'oignon uniquement**



HERBICIDES: HERBICIDE POST LEVÉE

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
MALAW (Oxyfluorène 120g/L+ oxadiazon 90 g/L)	Herbicide sélectif efficace pour la suppression de la plupart des mauvaises herbes graminées et dicotylédones. Il s'applique en pré-levée ou après la plantation des cultures d'oignons.	L'oxadiazon est un herbicide de contact sélectif utilisé dans le contrôle en pré-levée et en post-levée des liserons, des graminées et des mauvaises herbes annuelles à feuilles larges. Oxyfluorène agit par contact sur les plantules en place et au fur et à mesure de leur germination.	DOSE : 3 à 4 Litres dans 300 à 400 litres d'eau / ha DAR : minimum 56 jours	




HERBICIDES: HERBICIDE POST LEVÉE


Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
GARMIFORT (Haloxypop-R-méthyl 108g/l)	est utilisé en post-levée pour lutter contre les adventices (monocotylédones annuels et pluriannuels) présentes sur les cultures telles que tomates, oignons, arachide, coton etc...	Les meilleurs résultats sont obtenus par des applications sur des populations de graminées adventices entièrement levées, n'excédant pas 15 à 25 cm de hauteur. Pour lutter contre le pâturin annuel, l'optimum d'efficacité se situe lorsque le traitement a lieu entre le stade 2 à 4 feuilles des adventices et la fin tallage. Les pommes de terre seront traitées avant la fermeture des rames .	DOSAGE maximal : 1 à 1,5 litre par hectare.	



BOMBARDIER (Propaquizalofob 100g/l)	est utilisé en post-levée pour lutter contre les adventices graminées annuels et vivaces présentes sur les cultures telles que poivrons tomate, oignons, arachide, aubergine, melon choux pomme de terre etc...	Sa persistance d'action est de 1 mois. Il pénètre rapidement au sein de la plante par les feuilles et descend vers les racines. Il bloque l'étape initiale de la synthèse des acides gras principalement au niveau des méristèmes.	DOSAGE maximal : 1 litre par hectare. DAR : 7 Jours	
---	--	--	---	---

HERBICIDES: HERBICIDE POST LEVÉE

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
ETHOMAX 500 SC Contient 500G/L d'Ethofumesate	ETHOMAX est un herbicide sélectif utilisé pour contrôler les mauvaises herbes dans les cultures de betteraves et les gazons . Il cible principalement les graminées annuelles et certaines dicotylédones.	L'éthofumesate perturbe la croissance des mauvaises herbes en inhibant la synthèse des lipides essentiels, ce qui entraîne leur mort. Il agit de manière systémique en étant absorbé par les racines et les feuilles.	Dose : 2,4 à 3,2 Litres par Hectare	



HERBICIDES: HERBICIDE POST LEVÉE

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
CLETOR (cletodim240 g/l)	Efficace pour le désherbage sélectif des fruits et légumes (pomme de terre, carotte, oignons, poireaux, tomate et jaxatou) contre les graminées.	Herbicide systémique sélectif et post levé . absorbé par les feuilles puis transporté par la sève et empêchant la formation de nouvelles cellules entraînant ainsi le dépérissement des mauvaises herbes.	Dose : 1 litre par hectare soit 80cc/16Litre DAR : 30 jours	




METRIFORT (Metribuzine 350g/)	Herbicide pré-levée à large spectre d'action contre la majorité des mauvaises herbes annueelles aussi bien des graminées et des dicotylédones.	Absorbsion foliare et radiculaire Il s'applique sur un sol humide pendant et avant et après la levée de la culture mise en place avant que les pousses atteignent 5 cm.	Dose : 0,5 litre par hectare 40cc/16Litre DAR : 30 jours	
---	--	--	---	--

Excellent herbicide post-levée contre les adventices de la tomate et pomme de terre



HERBICIDES: HERBICIDE POST LEVÉE

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
BO' MAÏS (nicosulfure 400g/l)	Efficace pour le désherbage sélectif. Il est utilisé dans la culture du maïs , pour le contrôle des adventices graminées (dicotylédones vivaces).	Le nicosulfuron est un herbicide systémique de post-levée. Il est absorbé par les feuilles et les racines et transporté dans toute la plante. Il inhibe l'action de l'enzyme végétale acétolactate synthase (ALS) ce qui bloque la production de certains acides aminés nécessaires à la division cellulaire et la plante adventice meurt progressivement	Dose : 1 litre par hectare 80ml à 120ml /16Llitre DAR : 30 jours	



HERBICIDES: HERBICIDE POST LEVÉE

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
GALAMED (Penoxulame 25 g/L)	Herbicide sélectif post-levée efficace contre les mauvaises herbes présentes dans la culture du riz (graminées et dycotylédones). Il est également efficace contre les mauvaises herbes du maïs et sorgho et d'autres cultures céréalières.	C'est un herbicide sélectif et systémique absorbé par les feuilles en bloquant la croissance des mauvaises herbes.	1 Litre par hectare pour 8 pulvérisateurs de 16 litres. 250 ml pour 1/4 d'hectare dans 2 pulvérisateurs de 16 litres. 125 ml pour 1 pulvérisateur de 16 litres.	



Graminées



Cypéracées



Dicotylédones



HERBICIDES: HERBICIDE POST LEVÉE

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
RIMAX (bensulfuron methyl 600g/kg)	Herbicide sélectif post-levée efficace contre les mauvaises herbes (graminées et dycotylédones) des rizières.	Herbicide sélectif et systémique absorbé par les feuilles et les racines agissant assez en bloquant la croissance des herbes L épandage peut se faire à l'aide d'une bouteille plastique (1,5L) dont le couvercle est percé de 3 trous pour produire des gouttes à répandre sur deux diagonales de la parcelle.	DOSAGE maximal : 100g par hectare à appliquer en post-levée au stade de 2 à 4 feuilles des adventices Au moment de l'application, la parcelle doit être d'une lame de 5 à 10 cm au moins 4 jours avant afin que les plantules d'adventices soient bien couvertes par l'eau.	
Les cibles de galamed et de cobra				



Graminées



Cypéracées



Dicotylédones




HERBICIDES: HERBICIDE PRÉ-LEVÉE


Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
PENDIMEX (Pendiméthaline 500g/L)	PENDIMEX est un herbicide de pré-levée pour la destruction des mauvaises herbes lors de culture des tomates, du maïs, des oignons, arachides, riz, coton, carottes, canne à sucre . Il agit par inhibition du développement des mauvaises herbes qui sont détruites au moment de leur levée ou au stade jeune plantule.	Pour être efficace, l'application se fait avant la levée des mauvaises herbes, sur un sol propre, le jour même du semis ou dans les 3 jours qui suivent. Remplir à moitié le réservoir avec de l'eau puis verser la dose nécessaire. Après agitation, compléter avec de l'eau claire	DOSE : Tomate, ail, chou, oignons, poireaux : 3,2 litres par hectare Maïs : 5 litres par hectare	



TRIFLURAL (480g/l trifluralin)	herbicide sélectif contre les mauvaises herbes graminées et dicotylédones pour cultures sélectives (oignons, haricot, laitue, poivron, tomate, ail, arachide, soja)	il inhibe le développement des racines en interrompant la mitose, et peut donc tuer les mauvaises herbes dès la germination.	DAR 30 JOURS 1 à 2L/ha	
--	---	--	---------------------------	---

HERBICIDES: HERBICIDE PRÉ-LEVÉE

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
PENDIFORT (Pendiméthaline 450g/L Micro- capsule)	PENDIMEX est un herbicide de pré-levée pour la destruction des mauvaises herbes lors de culture des tomates, du maïs, des oignons, arachides, riz, coton, carottes, canne à sucre . Il agit par inhibition du développement des mauvaises herbes qui sont détruites au moment de leur levée ou au stade jeune plantule.	Pour être efficace, l'application se fait avant la levée des mauvaises herbes, sur un sol propre, le jour même du semis ou dans les 3 jours qui suivent. Remplir à moitié le réservoir avec de l'eau puis verser la dose nécessaire. Après agitation, compléter avec de l'eau claire.	DOSE : Tomate, oignons, pomme de terre : 1,6 à 2,1 litres par hectare	



HERBICIDES: herbicide pré -levée

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
KHETEKHANE (Linuron 500g/kg)	Pré-levée efficace pour le blocage et l'élimination des mauvaises herbes dans la culture de l'oignon de la carotte et du poivron.	C'est un produit qui détruit les mauvaises herbes par inhibition de la photosynthèse (dicotylées annuelles, épilobe, séneçon commun, etc.)	100g/45l d'eau	




NB: Khetekane (linuron) peut être utilisé en post levé contre les cypéracées mais elle a comme conséquence de freiner la croissance de l'oignon entre 3 à 5 jours



**Excellent herbicide post-levée
contre les adventices sur la carotte**


HERBICIDES: HERBICIDE TOTAL

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
Glyphos (480 g/L GLYPHOSATE)	Assure une destruction totale des parties aériennes et souterraines des mauvaises herbes levées, annuelles ou vivaces même les plus coriaces (liserons, chiendents, chardons,...)	Il est rapidement absorbé par les parties vertes des plantes. Les premiers symptômes de destruction apparaissent 3 à 10 jours après le traitement. N'a pas d'action sur les graines dans le sol et n'est pas absorbé par les racines des plantes.	Doses : 6L/ 300 à 500 L/ha d'eau infestation 3L/ 300 à 500 L/ha d'eau annuel 12L/ 300 à 500 L/ha d'eau vivace	



Disponible en conditionnement de
100 g pour des doses 100g pour
16L et en concentration 360g/L

HERBICIDES: HERBICIDE TOTAL

Désignation	Type de culture	Mode d'action	Application	Photo du produit
FOSIMAX 15 SL (Glufosinate ammonium 150 g/l)	Herbicide de contact à absorption foliaire non sélectif à très large spectre d'efficacité, s'appliquant en post-émergence et agissant sur la plupart des dicotylédones annuelles, bisannuelles en détruisant, les parties aériennes de la plante vivace. Il est très efficace pour le défanage des pommes des terres.	Il agit par inhibition de la synthèse de la glutamate synthétase. Il est doté d'une action par contact et d'une longue persistance d'action.	Dose : désherbage 5 L par hectare, défanage de la pomme de terre, deux applications de 2,5 L par hectare à cinq jours d'intervalle.	

Défanage Pomme de terre

